


Antibiotikaempfehlungen

I. Harnwegsinfektionen



Sporadische Zystitis:

- Amoxicillin (11-15 mg/kg 2-3xtgl. p.o) oder Cephalexin (20-30 mg/kg 2xtgl. p.o.) über 3-5 Tage
- Amoxicillin/Clavulansäure (11-20 mg/kg 2-3xtgl. p.o.) oder Trim/Sulfa (15 mg/kg 2xtgl. s.c.) über 3-5 Tage



Rezidivierende Zystitis:


- Amoxicillin (11-15 mg/kg 2-3xtgl. p.o) 7-14 Tage
- Amoxi/Clav (11-20 mg/kg 2-3xtgl. p.o.)
- Trim/Sulfam (15 mg/kg 2xtgl. s.c.) 3-5 Tage; ggf. Verlängerung auf 10-14 Tage

Pyelonephritis:

- Amoxi/Clav (11-20 mg/kg 3x tgl. i.v.), 10-14 Tage
- Fluorchinolone und 3. Generation Cephalosporine

Lebensbedrohlichen erkrankten Tier oder schwieriger Resistenzlage bis zum Erhalt des Antibiogramms

- Trim/Sulfa (15mg/kg 2x tgl.s.c.) über 10-14 Tage



Bakterielle Prostatitis:

- Marbofloxacin (2 mg/kg 1x tgl. i. v./p.o.), 4-6 Wochen

Pyometra:

- Amoxi/Clav (12,5 -20 mg/kg 2-3x tgl.), 7-14 Tage